

Otitis Media Aguda (OMA).

PLATICA DE 5 MINUTOS

El oído se divide anatómicamente en 3 áreas primordiales:

- Oído externo
- Oído medio
- Oído interno

La otitis media aguda (OMA) es la inflamación del oído medio de inicio súbito. Se caracteriza por la presencia de líquido por la inflamación e infección del oído medio, el cual se encuentra localizado justo detrás del tímpano y se asocia con signos y síntomas de inflamación local.

Está relacionada íntimamente con otras infecciones de vías aéreas superiores (IVAS) y constituye una de las principales infecciones respiratorias agudas (IRA) en la edad pediátrica.

La trompa de Eustaquio es un conducto que va desde la mitad de cada oído hasta la parte posterior de la garganta. Normalmente, esta trompa drena líquido que se produce en el oído medio. Si esta trompa de Eustaquio se bloquea, se acumula líquido, lo cual puede causar una infección.

Es más frecuente en pacientes varones y en los meses de invierno, por lo que la mayor parte de la población sufre por lo menos un episodio de OMA en algún momento de la infancia.

Antes del inicio de los síntomas, es frecuente que el paciente presente datos de una infección de Vía aérea Superior incluso un resfriado.

Los síntomas de una infección aguda del oído en niños mayores o adultos incluyen: Dolor de oídos, Llenura en el oído, Sensación de malestar general, Congestión nasal, Tos, Letargo, Vómitos, Diarrea, Pérdida auditiva (temporal o permanente) en el oído afectado, Salida de líquido proveniente del oído, Pérdida del apetito.

La secreción de líquido amarillo o verde del oído puede significar que hay ruptura del tímpano. Acude a tu médico y no te automediques ni mediques a tus familiares.

“Ahora que lo sabes... Cuidate”